

التمرين الأول: (4 نقط) الجزء الأول والثاني مستقلان

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ و } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : \text{ نعتبر المصفوفتين } (M_3(\mathbb{R}), +, \times)$$

(نضع: $A^0 = I$ و $A^1 = A$ و $A^2 = A \times A$ و $A^{n+1} = A^n \times A$ لكل n من \mathbb{N})

0.5 ن1- بين أن: $A^{2k} = I$ ($\forall k \in \mathbb{N}$)

0.5 ن2- بين أن المصفوفة A تقبل مقلوبا A^{-1} ينبغي تحديده.

الجزء الثاني: ليكن a عددا حقيقيا .

لكل x و y من المجال $I =]a, +\infty[$ نضع: $x * y = (x - a)(y - a) + a$

0.5 ن1- (أ) بين أن $*$ قانون تركيب داخلي في I .

0.5 ن2- (ب) بين أن القانون $*$ تبادلي و تجميعي.

0.5 ن3- (ج) بين أن $(I, *)$ يقبل عنصرا محايدا يتم تحديده.

0.5 ن4- بين أن $(I, *)$ زمرة تبادلية.

3- نعتبر التطبيق: $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}_+^*$

$$x \mapsto \frac{1}{x - a}$$

0.5 ن1- (أ) بين أن التطبيق φ تشاكل تقابلي من $(I, *)$ نحو (\mathbb{R}_+^*, \times)

0.5 ن2- (ب) حل في المجموعة I المعادلة: $x^{(3)} = a^3 + a$ حيث: $x^{(3)} = x * x * x$

التمرين الثاني: (2.5 نقط)

ليكن $N = \underbrace{111\dots\dots 11}_{2010 \text{ مرة}}$

0.25 ن1- بين أن العدد N يقبل القسمة على 11

0.75 ن2- (أ) تحقق أن العدد 2011 أولي و أن $10^{2010} - 1 = 9N$

0.5 ن3- (ب) بين أن العدد 2011 يقسم العدد $9N$

0.5 ن4- (ج) استنتج أن العدد 2011 يقسم العدد N

0.5 ن3- بين أن العدد N يقبل القسمة على 22121

التمرين الثالث: (3.5 نقط)

الجزء الأول: ليكن m عددا عقديا غير منعدم. نعتبر في المجموعة \mathbb{C} المعادلة ذات المجهول z :

$$(E_m): z^2 + [(1-i)m - 4]z - im^2 - 2(1-i)m + 4 = 0$$

0.5 ن1 -1 تحقق أن العدد $z_1 = -m + 2$ حل للمعادلة (E_m)

0.5 ن2 -2 ليكن z_2 الحل الثاني للمعادلة (E_m)

0.5 ن1 (أ) بين أن: $im^2 + 2(1-i)m - 3 = 0 \Leftrightarrow z_1 z_2 = 1$

ن1 (ب) حدد قيمتي m بحيث: $z_1 z_2 = 1$

الجزء الثاني: المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم ومباشر (O, \vec{u}, \vec{v}) .

نعتبر التطبيق S الذي يربط النقطة M التي لحقها z بالنقطة M' التي لحقها z' بحيث: $z' - 1 = -(z - 1)$

و الدوران R الذي مركزه النقطة Ω ذات اللق $(1+i)$ وقياس زاويته $\frac{\pi}{2}$ و ليكن z'' لحق النقطة $M'' = R(M)$

0.25 ن1 -1 بين أن التطبيق S هو التماثل المركزي الذي مركزه النقطة ذات اللق 1

0.25 ن2 (ب) بين أن: $z'' = iz + 2$

0.25 ن2 -2 نفترض أن النقطة M تخالف النقطة O أصل المعلم ولتكن A النقطة التي لحقها 2

0.5 ن1 (أ) احسب $\frac{z'' - 2}{z' - 2}$ ثم استنتج طبيعة المثلث $AM'M''$

0.5 ن2 (ب) حدد مجموعة النقط M بحيث تكون النقط A و Ω و M' و M'' متداورة.

التمرين الرابع: (6.5 نقط)

الجزء الأول: دراسة الحلول الموجبة للمعادلة: $(E): e^x = x^n$ حيث n عدد صحيح طبيعي غير منعدم.

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجموعة $D = [0, 1[\cup]1, +\infty[$ بما يلي: $f(x) = \frac{x}{\ln x}$; $x \neq 0$
 $f(0) = 0$

و ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O, \vec{i}, \vec{j}) .

0.25 ن1 -1 تحقق أنه لكل x من المجموعة $[0, 1[\cup]1, +\infty[$ لدينا: $e^x = x^n \Leftrightarrow n = f(x)$

0.5 ن2 -2 بين أن الدالة f قابلة للاشتقاق على اليمين في 0

1.5 ن3 -3 احسب النهايات: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ثم أول هندسيا النتائج المحصل عليها.

0.75 ن4 -4 ادرس تغيرات الدالة f على كل من المجالين $[0, 1[$ و $]1, +\infty[$ ثم أعط جدول تغيراتها.

0.5 ن5 -5 بين أن المنحنى (C) يقبل نقطة انعطاف يتم تحديد زوج إحداثياتها.

0.5 ن6 -6 انشئ المنحنى (C)

7- بين أنه إذا كان $n \geq 3$ فإن المعادلة (E) تقبل بالضبط حلين اثنين a_n و b_n بحيث: $1 < a_n < e < b_n$ 0.5

الجزء الثاني: دراسة تقارب المتتاليتين $(a_n)_{n \geq 3}$ و $(b_n)_{n \geq 3}$

1- بين أن: $b_n \geq n$ ($\forall n \geq 3$) ثم استنتج نهاية المتتالية $(b_n)_{n \geq 3}$ 0.5

2- (أ) بين أن المتتالية $(a_n)_{n \geq 3}$ تناقصية ثم استنتج أنها متقاربة. 0.5

(ب) بين أن: $\frac{1}{n} < \ln(a_n) < \frac{e}{n}$ ($\forall n \geq 3$) ثم استنتج نهاية المتتالية $(a_n)_{n \geq 3}$ 0.5

(ج) بين أن: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^n = e$ 0.5

التمرين الخامس: (3.5 نقط)

نعتبر الدالة العددية F المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بما يلي: $F(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$

1- (أ) بين أن: $0 \leq F(x) \leq xe^{-x^2}$ ($\forall x \geq 0$) 0.5

(ب) بين أن: $e^{-x^2} \leq e^{-x}$ ($\forall x \geq 1$) ثم استنتج نهاية الدالة F عند $+\infty$ 0.5

2- بين أن F قابلة للاشتقاق على المجال $[0; +\infty[$ وأن: $F'(x) = e^{-2x^2} - 2xF(x)$ ($\forall x \geq 0$) 0.5

3- نعتبر الدالة العددية G المعرفة على المجال $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ بما يلي: $G(x) = F(\tan x)$; $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$
 $G\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$

(أ) بين أن الدالة G متصلة على اليسار في $\frac{\pi}{2}$ 0.25

(ب) بين أنه يوجد عدد حقيقي c من المجال $]0; +\infty[$ بحيث: $F'(c) = 0$ وأن: $F(c) = \frac{1}{2c} e^{-2c^2}$ 0.75

(يمكنك تطبيق مبرهنة رول (ROLLE) بالنسبة للدالة G على المجال $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$)

4- نعتبر الدالة العددية H المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بما يلي: $H(x) = F'(x) \frac{e^{x^2}}{2x}$

(أ) بين أن الدالة H تناقصية قطعاً على المجال $]0; +\infty[$ 0.5

(ب) استنتج أن العدد c وحيد ثم أعط جدول تغيرات الدالة F 0.5

انتهى